

***Stephanitis pyri* , Tigre du Poirier**



Cette punaise, sous-ordre des *Heteroptera*, mesure environ 6 mm. Son corps est segmenté en 3 parties :

- tête avec pièce buccale externe le rostre, 1 paire d'antennes et d'yeux
- thorax pourvu de 3 paires de pattes et 2 paires d'ailes
- abdomen.

Ce ravageur phytophage pond au revers de la feuille le long de la nervure, 2 à 3 générations par an. Adultes et larves se nourrissent de la sève en la suçant grâce à leur rostre. Ces multiples piqures diminuent les capacités chlorophylliennes jusqu'à une défoliation complète du poirier mais

également des : pommier, châtaignier et aubépine. Les déjections apparaissent comme des points noirs à côté des exuvies de chaque mue.

Moyens de lutte : sur un petit arbre, l'action manuelle déterminée stoppe leur prolifération. Sur de grands poiriers, favoriser une lutte biologique par des auxiliaires zoophages - chrysope, autre punaise *Stethoconus cyrtopeltis* (*Ephytia INRA*) - peut limiter sa pullulation . L'adulte passant l'hiver dans des abris : huile blanche sur l'arbre par une belle journée d'hiver, élimination des feuilles au pied de l'arbre.

