

## TRAITEMENT ET ENTRETIEN DU VERGER FIN SEPTEMBRE ET OCTOBRE

C'est le moment de préparer pour le printemps, la bonne santé de nos arbres fruitiers. En effet la plupart des traitements contre les bactéries et les maladies cryptogamiques (champignons) ne peuvent être efficaces qu'en action préventive, rarement en action curative lorsque la maladie est déclarée.

### Arbres à noyaux

Pour la deuxième année nous avons encore eu avec le printemps pluvieux une forte attaque de cloque (champignon Taphrina déformant) sur **les pêchers**. La cloque non traitée conduit l'arbre à une durée de vie brève. Un premier traitement fongicide à base de cuivre peut être effectué avant la chute des feuilles, au jaunissement à demi-dose (Bouillie Bordelaise 10à12g/l) puis après la chute des feuilles(20à25g/l).

La moniliose (champignon Monilia fructigena) se développe particulièrement sur les **abricotiers et les pruniers** qui y sont souvent très sensibles. Cette attaque se constate par un dessèchement, dès le printemps, des extrémités des jeunes pousses et le pourrissement des fruits. Il faut effectuer dès maintenant un traitement fongicide à la bouillie Bordelaise et éliminer les fruits desséchés si possible par le feu. Au printemps après le débourrement il sera bénéfique d'utiliser le CUIVROL en foliaire contenant Cuivre mais aussi Fer, Bore, Zinc.

### Arbres à pépins

la rouille grillagée **du poirier**, encore un champignon (Gymnosporangium fuscum) est à traiter également à la bouillie Bordelaise. Il faut bien imprégner les branches et le tronc, le mycélium se mettant aussi dans le bois. On identifie la rouille à la couleur de ses petites taches qui s'étalent au dos des feuilles. Il n'est pas toujours facile de faire la différence avec le phytopte des galles rouges dont la feuille présente des taches rouges et gaufrées, à traiter au soufre liquide.

Un autre champignon (Venturia inaequalis) qui provoque la Tavelure sur les **pommiers** fait de gros dégâts si on le laisse se développer d'une année sur l'autre. Ce parasite tachant de brun les feuilles et les fruits jusqu'à la chute. Plusieurs traitements à la bouillie Bordelaise ou au cuivrol (8g /l) sont nécessaires jusqu'au débourrement des bourgeons au printemps. Il faut tailler en aérant le cœur de l'arbres et détruire feuilles et fruits sans les composter.

**Les traitements d'automne sont une priorité. Penser à débarrasser le verger de tous les fruits au sol, malades ou infestés. En profiter pour repérer les troncs blessés, les nettoyer et appliquer un badigeon argile verte, bouillie bordelaise (20g /l) ou du sulfate de fer (une cuillère à soupe pour 1 litre) qui est un excellent cicatrisant pour les plaies de taille.**

